

Fiche de préparation pour les seringues d'antibiotiques – Péritonite

- 1- Prélever le volume d'antibiotique selon la prescription.
- 2- Mettre des aiguilles 20G, 1 pouce au bout de chaque seringue

MÉDICAMENTS Nom générique (novateur) (conservation)	Reconstitution de la fiole					Préparation de la seringue			
	Format	Volume de diluant (ESI)	Concentration	Stabilité de la fiole reconstituée ou ponctionnée		Volume à prélever	Concentration finale	Stabilité	
				T° pièce	Réfrigéré			T° pièce	Réfrigéré
CéFAZoline (TP)	1 g	9.6 mL	100 mg/mL	24 h	24 h	Selon la dose	100 mg/mL	24 h	9j
CefTAZidime (TP, abri lumière)	1 g	10 mL	100 mg/mL	12 h	24 h	Selon la dose	100 mg/mL	12 h abri lumière sac ambré	4 j abri lumière sac ambré
	2 g	19 mL							
	6 g	56 mL							
Tobramycine (multidose) (TP)	800 mg/20 mL	--	40 mg/mL	28 j	24 h	Selon la dose	40mg/mL	24 h	9j
Vancomycine (TP)	1 g	20 mL	50 mg/mL	24 h	24 h	Selon la dose	50mg/mL	24 h	7 j
	5 g	100 mL							

Version 1.0 5 juillet 2023, jodianne couture pharmacienne, adapté du tableau SCAS