

# ADULTE

## DOBUTamine (Dobutrex<sup>md</sup>)

INDICATION : Choc cardiogénique

Classe thérapeutique : Agoniste adrénergique

| FORMATS DISPONIBLES                                          | RECONSTITUTION    |                      | DOSE                                  | MODE DE DILUTION                                                                        | TEMPS D'ADMINISTRATION                                                                                                                                                                                                                  | REMARQUES                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | VOLUME ET DILUANT | CONCENTRATION FINALE |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Fiole unidose 250 mg/20 mL                                   | Déjà dilué        | 12,5 mg/mL           | 500 mg (40 mL)<br><i>volume total</i> | Compléter ad 250 mL de NS<br>Concentration de 2 mg/mL (2000 mcg/mL) <i>retirer 40mL</i> | Perfusion continue par voie centrale ou veine périphérique de gros calibre<br>Le débit de perfusion est généralement ajusté selon une cible d'index cardiaque aux 3-5 minutes.<br>Une perfusion à débit fixe est tout de même possible. | La solution peut être utilisée même si elle est rosée.<br><br>Début action : 1-10 minutes<br>Pic d'action : 10-20 minutes |
| Conservation :<br>Température ambiante<br>Abri de la lumière |                   |                      | 1000 mg (80 mL)                       | Compléter ad 250 mL de NS<br>Concentration de 4 mg/mL (4000 mcg/mL) <i>retirer 80mL</i> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |

Stabilité pour une préparation à l'unité de soins :

Fiole utilisée : Jeter toute portion inutilisée

Seringue ou sac : L'administration doit débuter dans l'heure suivant la préparation.

Compatibilité avec les solutés : D5%, NS, D5%-NS, D5%-NaCl 0,45%, D10%

Incompatibilité : Se référer au tableau des compatibilités. Incompatible avec les solutions alcalines

Rév. : 2022-04-11 09:46

est-ce possible de l'écrire plus clairement ? comme de l'entente)  
Merci j Anie  
Page 1 sur 2 (autres page)

pharmacie ne peut modifier

validé à Isabella pharmacie on doit enlever 40mL du sac



À SURVEILLER / CONDITION PARTICULIÈRE


TRAITEMENT ACTIF/PATIENT INSTABLE :

MONITORAGE CARDIAQUE, INDEX CARDIAQUE, TVC

TRAITEMENT PALLIATIF DE L'IC TERMINALE :

INITIATION AUX SOINS INTENSIFS, À L'UNITÉ CORONAIRE OU À L'URGENCE AVEC MONITORAGE CARDIAQUE OU SV Q1h, PUIS Q4h LORSQUE PERFUSION À DOSE FIXE.

TRANSFERT POSSIBLE À L'ÉTAGE AVEC TÉLÉMÉTRIE SI PERFUSION À DOSE FIXE POUR PLUS DE 12h. MESURE SV Q8h



# ADULTE

## FentaNYL (Sublimaze<sup>md</sup>)

INDICATION : Anesthésie, analgésie et sédation

Classe thérapeutique : Opioïde synthétique

| FORMATS DISPONIBLES                                        | RECONSTITUTION                                                   |                      | DOSE                                                              | MODE DE DILUTION                   |  | TEMPS D'ADMINISTRATION      | REMARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | VOLUME ET DILUANT                                                | CONCENTRATION FINALE |                                                                   | COMPLÉTER AVEC ou DILUER DANS      |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ampoules                                                   | Déjà dilué                                                       | 50 mcg/mL            | Bolus                                                             | Aucune dilution supplémentaire     |  | IV directement en 2 minutes | Se référer au tableau des puissances relatives et des caractéristiques pharmacocinétiques des opioïdes .<br><br>Peut s'utiliser en injection ou perfusion SC, IM, par voie épidurale ou intranasale.<br><br>Se référer au protocole en vigueur dans l'installation pour le suivi des patients sous « Analgésie contrôlée par le patient (ACP/PCA) » |
| 100 mcg/2 mL                                               |                                                                  |                      | Perfusion                                                         | Concentration usuelle<br>10 mcg/mL |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 250 mcg/5 mL                                               |                                                                  |                      | Diluer 2500 mcg (50 mL) dans 200 mL de NS (volume final : 250 mL) |                                    |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fioles                                                     |                                                                  |                      | Ou                                                                |                                    |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 500 mcg/10 mL                                              |                                                                  |                      | Diluer 1000 mcg (20 mL) dans 80 mL de NS (volume final : 100 mL)  |                                    |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1000 mcg/20 mL                                             | Patient en surcharge liquidienne                                 |                      |                                                                   |                                    |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conservation :<br>Température ambiante<br>Armoire sous clé | 20 mcg/mL                                                        |                      | 20 mcg/mL                                                         |                                    |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            | Diluer 2000 mcg (40 mL) dans 60 mL de NS (volume final : 100 mL) |                      |                                                                   |                                    |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                                                  |                      |                                                                   |                                    |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Stabilité pour une préparation à l'unité de soins :

Fiole utilisée : Jeter toute portion inutilisée

Seringue ou sac : L'administration doit débuter dans l'heure suivant la préparation. Stabilité de 24 h à la température ambiante.

Compatibilité avec les solutés : NS, D5%, LR

Incompatibilité : Se référer au tableau de compatibilités