



B Q Q Q 1

INSTALLATION : \_\_\_\_\_

## **ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES**

## CHIRURGIE GÉNÉRALE - POSTOPÉRATOIRE

Allergies médicamenteuses<sup>1</sup>/intolérances<sup>1</sup> :

ANNÉE                    MOIS                    JOUR                    h  
Date                    Heure                    Poids<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_ kg      Taille<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_ cm

Soluté

- D5 % + NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq/L IV     Lactate Ringer IV    Autres : \_\_\_\_\_

### **Thromboprophylaxie**



Favoriser héparine si clairance à la créatinine plus petite ou égale à 20 mL/min, favoriser fréquence TID si poids supérieur à 100 kg

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Héparine 5000 unités SC à 22 h le soir de la chirurgie | <b>PUIS →</b><br>à débuter<br>le lendemain<br>à 10 h | <input type="checkbox"/> Daltéparine (Fragmin) 2500 unités SC DIE : poids inférieur à 40 kg<br><input type="checkbox"/> Daltéparine (Fragmin) 5000 unités SC DIE : poids de 40 à 100 kg<br><input type="checkbox"/> Daltéparine (Fragmin) 7500 unités SC DIE : poids supérieur à 100 kg et pas d'épidurale en cours |
|---|--|---|

- Tinzaparine (Innohep) 75 unités/kg SC DIE Débuter :  Ce jour à 22 h OU  Demain à 10 h

#### Doses de tinzaparina\*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Poids de 55 kg et moins : 3500 unités SC DIE     | <input type="checkbox"/> Poids entre 110 kg et 129 kg : 9000 unités SC DIE  |
| <input type="checkbox"/> Poids entre 56 kg et 70 kg : 4500 unités SC DIE  | <input type="checkbox"/> Poids entre 130 kg et 165 kg : 10000 unités SC DIE |
| <input type="checkbox"/> Poids entre 71 kg et 85 kg : 6000 unités SC DIE  | <input type="checkbox"/> Poids de 166 kg et plus : 14000 unités SC DIE      |
| <input type="checkbox"/> Poids entre 86 kg et 109 kg : 7000 unités SC DIE | * Si épidurale en cours, ne pas utiliser tinzaparine                        |

#### **Élimination intestinale**

- Polyéthylène glycol (Lax-A-Day) 17 g PO DIE jusqu'à la première selle, puis au besoin  
Si coché, prévaut sur Algorithme d'analgésie multimodale auprès de la clientèle adulte

#### **Autres ordonnances pharmaceutiques**

- Dexlansoprazole (Dexilant) 30 mg PO DIE si prise de célecoxib (Celebrex) ou d'autre AINS (excluant ASA)  
→ Valide si l'usager ne prend pas d'inhibiteur de pompe à protons (voir verso)

COP1-CH-018

Signature du médecin prescripteur

**Nom en caractère d'imprimerie**

Nº de permis

<sup>1</sup> Documenter dans le DCI (ARIANE), lorsque disponible

**Numérisé le** (année/mois/jour) :      /      /      à      h

Ce formulaire est également disponible dans le DCI (ARIANE) section Références

## **ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES**

### **CHIRURGIE GÉNÉRALE - POSTOPÉRATOIRE**

Privilégier l'utilisation du dextansoprazole (Dexilant) en présence d'un des critères suivants :

- Âge plus de 65 ans;
- Antécédents d'ulcus.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter le dextansoprazole (Dexilant) si l'usager prend un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) de façon régulière, tel que dextansoprazole (Dexilant) ou ésoméprazole (Nexium) ou lansoprazole (Prevacid) ou oméprazole (Losec) ou pantoprazole (Pantoloc) ou rabéprazole (Pariet).