



PROTOCOLE DE RECHERCHE - PRISM-1-
Quemliclustat/Placebo - nab-PACLitaxel -
GEMCITABINE

Cancer du pancréas

Cycle	Nombre de cycles	Durée (jours)	
	Indéterminé	28	
Taille (cm)	Poids (kg)	Surface (m ²)	Allergies

Page 2 de 2

Pre-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale

30 min pré-chimiothérapie

Note : si applicable, la pré-médication peut être administrée pendant la période d'observation du Quemliclustat ou Placebo.

Chimiothérapie

nab-PACLitaxel 125 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1, Jour 8, Jour 15

dans un Viaflex à perfuser en 30 minutes.

Gemcitabine 1000 mg/m² = mg intraveineux

Jour 1, Jour 8, Jour 15

dans 250 mL de D5% en 30 minutes

Post-chimiothérapie

Prochlorpérazine 10 mg orale

aux 4 à 6 heures si besoin

Signature du prescripteur (no de permis)

Date de prescription

Signature du pharmacien

Date de validation

Dernière modification : 2025-08-15 09:02

ORDONNANCES PHARMACEUTIQUES - CHIMIOTHÉRAPIE

PRISM-1

DOSSIER MÉDICAL