

Pharmacie - PHAR-Général #104

Pentamidine nébulisation (instructions à compléter)

2024-01-10 15:21 - Raphaël Coutu

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2024-04-25
Assigné à:	Marie-Josée Lachance		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:			
Description			
Demande C2#2404505 (par MGilbert)			
Suite à une révision des procédures d'inhalothérapie par une étudiante cet été, j'aimerais qu'on modifie la codification de la pentamidine nébulisée. Selon la procédure inhalo, la pentamidine inhalée est diluée avec 6 ml d'eau stérile pour une solution à 50 mg/mL			
Produit: Pentamidine 150 mg			
Instructions: Pour la voie NÉBULISATION, modifier la dilution de la fiole pour 6 mL d'eau stérile pour une concentration de 50 mg/mL. Stable 60 minutes à température pièce. PAR INHALOTHÉRAPEUTE			

Historique

#1 - 2024-04-03 20:26 - Marie-Josée Lachance

- Assigné à mis à Marie-Josée Lachance

#2 - 2024-04-03 20:39 - Marie-Josée Lachance

@Mélanie Gilbert Est-ce que c'est pour les dose de moins de 150 mg et/ou 150 mg et plus

#3 - 2024-04-04 16:36 - Mélanie Gilbert

@mjlachance pour les deux doses. Dans la procédure d'inhalo, on ne spécifie pas une dilution différente selon la dose à administrer

#4 - 2024-04-04 20:10 - Marie-Josée Lachance

- Équipes Ariane supprimé

En Dev

#5 - 2024-04-04 20:10 - Mélanie Lacerte

- Echéance mis à 2024-04-25

- Statut changé de Accepté à Attente MEP

#6 - 2024-05-13 14:24 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu