

Mucomyst en néonate

2024-04-15 18:52 - Camille Dufort-Rouleau

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2025-01-16
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Utilisation du mucomyst en PO et en IR en néonatalogie avec une solution diluée à 5%. Est-ce possible de l'ajouter dans Ariane? La dilution sera faite directement à l'étage selon la recette suivante :			
PO, IR : Dilution à 5% : 1 mL d'acétylcystéine 20% + 3 mL de NaCl0.9% ou d'eau stérile (total 4 mL).			
Aussi, pour la nébulisation : administration de la solution pure ou diluée avec 2 mL de NaCl0.9% (total 3 mL). Est-ce que ça vaut la peine de faire une entrée séparée vs ajout possible d'une instruction? Je vous laisse voir!			
Si besoin, la fiche a été mise à jour dans le partage de néo.			
Merci!!			

Historique

#1 - 2024-04-17 18:55 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2024-11-20 20:17 - Myriam Breton

- Assigné à mis à Myriam Breton

J'ai fait DEV mais je dois vérifier comment ça sort pour éviter confusion à l'étage avec les fioles non diluées.
À qui de droit, est-ce qu'on veut des voies alternatives à cette concentration.
Pour inhalation, je laisserais idem vu que c'est géré par inhalothérapeute. Est-ce ok?

#3 - 2024-11-20 20:17 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à En cours


#4 - 2024-11-20 20:52 - Camille Dufort-Rouleau

Seulement PO ou IR pour les voies.
Ok pour nébulisation !

#5 - 2024-12-05 21:20 - Myriam Breton

- Fichier clipboard-202412051619-oyim2.png ajouté

@Cathy Desaulniers Salut! Je voulais savoir si tu trouves ça assez clair à l'étage pour éviter la confusion avec les fioles non diluées!
Merci



#6 - 2024-12-19 22:08 - Cathy Desaulniers

Je vais vérifier demain avec les infirmières à l'étage et je te reviens

#7 - 2025-01-08 18:35 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-01-16

- Statut changé de En cours à Attente MEP

Validé par équipe de néo. Fait en DEV

#8 - 2025-01-17 19:46 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu

#9 - 2025-01-26 18:12 - Emile Bouchard

- Statut changé de Résolu à Accepté

[@Myriam Breton](#)

Salut,

Je l'ai remise active parce que le mucomyst po en solution sortait d'emblée avec le produit de néonate même chez l'Adulte.

J'ai mis les deux produits (à rediluer et déjà diluer) comme hors formulaire au CHUS pour éviter la sélection accidentelle.

Je n'étais pas certain de comment tu avais réfléchi le tout.

Merci

Emile

#10 - 2025-01-26 19:02 - Myriam Breton

Salut! J'avais inscrit la concentration dans la néonate, mais il n'y avait pas de concentration dans le PO adulte donc ça sélectionnait lui de néonate j' imagine. J'ai ajouté la concentration de 200 mg/mL dans les voies PO et Rectale pour la sélection usuelle pour éviter l'erreur.

Fait dev et PROD. Est-ce que je ressort du hors formulaire?

#11 - 2025-01-27 17:10 - Emile Bouchard

salut

pas de problème,

Je n'Avais juste pas le temps d'investiguer la patente!

Tu peux le remettre au formulaire quand tu es prête

#12 - 2025-03-25 15:34 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à Résolu

Fichiers

clipboard-202412051619-oyim2.png	187 ko	2024-12-05	Myriam Breton
----------------------------------	--------	------------	---------------