

# Pharmacie - PHAR-Général #258

## Ajout budésonide Ucéris mousse rect

2024-07-03 17:20 - Mélanie Lacerte

<b>Statut:</b>	Attente MEP	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Bas	<b>Echéance:</b>	2025-12-04
<b>Assigné à:</b>			
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>			
<b>Équipes:</b>	Ariane		
<b>Description</b>			
Budésonide (Uceris)	Budésonide mousse rect. 2mg/dose	Au formulaire. Autorisé pour poursuite de traitement de la colite ulcéreuse distale évolutive Garder hors inventaire	
<b>Avant d'appliquer la mousse rectale, le patient doit aller à la selle.</b>			
Réchauffer la cartouche avec les mains tout en l'agitant vigoureusement pendant 10 à 15 secondes avant l'utilisation.			
La mousse rectale UCERIS peut être appliquée en position debout, couchée ou assise (p. ex., sur la toilette).			
Conserver à une température comprise entre 15 et 30 °C.			
Ne pas réfrigérer.			

### Historique

#1 - 2025-10-31 15:28 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-12-04
- Statut changé de Accepté à Attente MEP

Fait DEV.

### Fichiers

clipboard-202407031200-byjsf.png	4,91 ko	2024-07-03	Mélanie Lacerte
clipboard-202407031202-stzp9.png	28 ko	2024-07-03	Mélanie Lacerte
clipboard-202407031203-2kqix.png	5,46 ko	2024-07-03	Mélanie Lacerte
clipboard-202407031203-ahe5a.png	2,59 ko	2024-07-03	Mélanie Lacerte