

Pharmacie - PHAR-Général #309

CODAGE DÉSENSIBILISATION PEG-ASPARAGINASE DANS ARIANE (PED ET ADULTES)

2024-09-04 20:29 - Gabrielle Ferland

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Haut	Echéance:	2025-01-16
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description Bonjour, Il faudrait coder les désensibilisations version ADULTE et PED pour la Peg-Asparaginase. Voir les 2 modèles dans les calculateurs ci-joint (dose fictive utilisée). Le protocole de désensibilisation est déjà codé pour plusieurs autres agents en adulte dans ariane (ordonnance pharmacie -> Chimio -> Protocoles adulte -> Désensibilisation). Je propose de calquer ce qui existe déjà pour l'adulte et d'ajouter la peg-asparaginase. Pour la Ped, il faudra tout coder à partir de zéro (s'inspirer de l'adulte svp). Si question, contacter Gabrielle ou autre pharmacienne d'onco-ped au 13640. Merci!			

Historique

#1 - 2024-09-04 20:34 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Priorité changé de Normal à Haut
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2024-12-09 15:23 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-01-16
- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV

J'ai modifier la durée de l'administration de la famotidine en ped car était IV 30 min et pas IV 15 min comme le 12b ped.

#3 - 2025-01-17 19:10 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu

Fichiers

Désensibilisation asparaginase PED.pdf	834 ko	2024-09-04	Gabrielle Ferland
Désensibilisation asparaginase ADULTE.pdf	834 ko	2024-09-04	Gabrielle Ferland