

Pharmacie - PHAR-Général #416

Préparation SCAS des seringues de dexmedetomidine en néonate

2025-02-04 20:35 - Kevin Côté

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2025-06-12
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Les perfusions de dexmédétomidine sont rares en néonate, mais lorsqu'elles sont prescrites, il faudrait qu'elles soient préparées au SCAS (comme les autres perfs pour cette population). Serait-ce possible de créer une entrée pour cette population de manière à ce que les étiquettes sortent au SCAS et non au chariot? La concentration reste à 4mcg/mL.			
Actuellement, lorsque je change manuellement la file, elle revient toujours au chariot quand je fais un changement de débit et c'est à risque d'erreur.			
Merci,			

Historique

#1 - 2025-02-05 21:39 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2025-02-11 13:19 - Cathy Desaulniers

- Assigné à mis à Cathy Desaulniers
- Équipes Pompe, SCAS ajouté

SVP faire recette dans seringue ad 25ml (100 mcg dans 25 ml total NS ou D5%) pour permettre préparation dans seringue de 30 ML car plus grande précision sur le pousse-seringue vs seringues de 50ml.

#3 - 2025-03-25 17:50 - Cathy Desaulniers

- Assigné à Cathy Desaulniers supprimé

#4 - 2025-04-15 15:29 - Lorraine Legeleux

- Équipes SCAS supprimé

la possibilité à été ajoutée au tableau scas.
M'aviser si je supprime l'autre recette dans 50 mL.

#5 - 2025-05-01 14:43 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe supprimé

Ne s'applique pas aux pompes, car Precedex codé en terme de concentration et non en volume.

#6 - 2025-05-08 16:08 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-06-12
- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV
Ajouter Precedex 4 mcg/mL dans soluté néonate pour Ser ad 25 mL D5 et NS
J'ai enlevé le Precedex dans Unit mix (ce pourquoi il sortait toujours au chariot).

#7 - 2025-07-23 19:57 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu