

Pharmacie - PHAR-Général #437

Coder VÉLAGLUCÉrase ALFA (VPRIV)

2025-02-24 20:11 - Mélanie Lacerte

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Statut:        | Accepté | Début:    |
| Priorité:      | Bas     | Echéance: |
| Assigné à:     |         |           |
| Catégorie:     |         |           |
| Version cible: |         |           |
| Équipes:       | Ariane  |           |

|                            |                                          |                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description                |                                          |                                                                                                                                           |
| Velaglucerase alfa (Vpriv) | Velaglucerase alfa 400 unités pd perf IV | Au formulaire pour poursuite de traitement des adultes et des enfants atteints de la maladie de Gaucher de type 1. Garder hors inventaire |

4.3 Administration

VPRIV doit être administré par perfusion intraveineuse d'une durée de 60 minutes.

Tableau 1 – Reconstitution

| Taille du flacon | Volume de diluant à ajouter au flacon | Volume disponible approximatif | Concentration nominale par mL |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 400 U/ flacon    | 4,3 mL                                | 4,0 mL                         | 100 U/mL                      |

- particules étrangères.
4. Retirez le volume calculé de médicament du nombre approprié de flacons et diluez le volume total requis dans 100 mL d'une solution de chlorure de sodium à 0,9 % appropriée pour une administration i.v. Mélangez doucement. N'AGITEZ PAS. Une légère floculation (décrite comme la formation de particules blanches de formes irrégulières) peut parfois se produire.

Préparation au SCAS car \$\$\$

L'administration de VPRIV doit s'effectuer à travers un filtre intégré de 0,2 µm sur une période de 60 minutes. La perfusion doit avoir lieu dans les 24 heures suivant la reconstitution des flacons.

VPRIV doit être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 °C (36 et 46 °F).

Historique

#1 - 2025-03-25 17:26 - Cathy Desaulniers

Attendons fiche 12B

#2 - 2025-06-02 20:33 - Lorraine Legeleux

- Équipes SCAS supprimé

à coder dans 100 mL de NS (pas ad 100 parce que c'est des petits volumes, pas besoin de retirer). Merci.

#3 - 2025-06-04 18:49 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe supprimé

Déjà codé.

#4 - 2025-09-18 18:23 - Mélanie Gilbert

- Équipes 12B-Adulte supprimé

La fiche 12B est en circulation depuis 11-2022

Fichiers

|                                  |         |            |                 |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|
| clipboard-202502241506-3on5n.png | 11,6 ko | 2025-02-24 | Mélanie Lacerte |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|

|                                  |         |            |                 |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|
| clipboard-202502241506-2ubvb.png | 10,3 ko | 2025-02-24 | Mélanie Lacerte |
| clipboard-202502241507-w2lng.png | 20,6 ko | 2025-02-24 | Mélanie Lacerte |
| clipboard-202502241508-fetrq.png | 34,8 ko | 2025-02-24 | Mélanie Lacerte |