

Pharmacie - PHAR-Général #551

Changement message automatique des Ariane

2025-06-12 17:32 - Jocelyn Dion

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2025-09-01
Assigné à:			
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Bonjour,			
Dans le cadre d'un projet sur l'évaluation de la qualité de l'acte pharmaceutique, nous avons constaté un conformité de moins de 50% pour la gestion des interaction ion / agent chélateur avec quinolone / tétracycline.			
J'aimerais si possible qu'on modifie les instructions / commentaires automatiques pour les quinolones / tetracycline.			
Les instructions / commentaires concernant les interactions de ces molécules avec les ions multivalents (calcium, magnésium, zinc.. etc) et les agents chélateurs (ex : sevelamer, sulcralfate, etc.) sont parfois éronnés.			
Il faudrait que les instructions / commentaires soient les mêmes que les recommandations qui figurent dans le document-ci joint.			

Historique

#1 - 2025-06-12 18:09 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2025-06-22 19:05 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à En cours

[@Jocelyn Dion](#) Qu'en est-il du gavage, est-ce qu'il est considéré comme le calcium alimentaire?

Fait DEV et PROD pour les instructions de produits. Je laisse ouvert en attendant la réponse à Jocelyn. J'ai laissé idem pour le gavage ad nouvel ordre.

[@Myriam Breton](#) Pour les gavages, j'inscrirais les mêmes précautions que pour les ions (par souci de simplification du message et uniformisation avec le guide disponible dans ariane [guide des médicaments érasables et compatibilité avec nutrition entérale])

#3 - 2025-07-11 18:07 - Myriam Breton

J'ai mis à jour les instructions de produit pour la nutrition entérale. DEV et PROD

[@Mélanie Lacerte](#) je comprend pas dans le document [guide des médicaments érasables et compatibilité avec nutrition entérale], l'interaction avec la moxifloxacine demande de cesser la nutrition entérale 2h avant et 8h après le médicament. J'aurais cru que ca serait l'inverse. Cesser la nutrition 8h avant et 2h après À corriger? J'ai quand même copier ca dans Ariane pour que ca concorde.

#4 - 2025-09-03 12:03 - Myriam Breton

[@Jocelyn Dion](#) dans le document [guide des médicaments érasables et compatibilité avec nutrition entérale], l'interaction avec la moxifloxacine demande de cesser la nutrition entérale 2h avant et 8h après le médicament. J'aurais cru que ca serait l'inverse comme le 2h avant et 6h après de la cipro. Cesser la nutrition 8h avant et 2h après À corriger? J'ai quand même copier ca dans Ariane pour que ca concorde.

#5 - 2025-10-30 13:28 - Myriam Breton

- Statut changé de En cours à Résolu

J'ai pas de réponse donc je ferme jusqu'à ce que la question revienne

Fichiers

Quinolone et ions multivalents_10-02-2022.docx

269 ko

2025-06-12

Jocelyn Dion