

Pharmacie - PHAR-Général #615

Enlever Flécainide suspension PO 5 mg/mL

2025-08-27 15:45 - Rémi St-Germain

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane, Magistrale		
Description			
Il ya actuellement 2 concentrations de suspension PO de flécainide (5 et 20 mg/mL). Erreur évité de justesse de donner 4 fois la dose au patient (servi de le 20 mg/mL, ensuite changé pour 5 mg/mL au dossier par erreur en changeant de voie PO à TNG, donc volume 4 fois trop gros à la FADM). Discuté entre phm de ped et néo: Pas besoin de la 5 mg/mL.			

Historique

#1 - 2025-09-02 16:26 - Emile Bouchard

- Assigné à mis à Myriam Breton
- Priorité changé de Normal à Haut

@Myriam Breton Si tu as 2 min stp

#2 - 2025-09-02 20:53 - Myriam Breton

Fait DEV et PROD (ptp et ptd)
@Emile Bouchard faut pas oublier de changer statut nouveau a accepté sinon je le vois pas. J'ai vu le courriel. Peux tu la résoudre?
Merci

#3 - 2025-09-10 08:01 - Emile Bouchard

- Statut changé de Nouveau à Résolu