

Pharmacie - PHAR-Général #624

Modifier le protocole de désensibilisation en oncologie

2025-09-10 18:48 - Brigitte Boilard

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Joly-Mischlich		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Discuté avec Thomas			
Modifier le protocole de désensibilisation en oncologie pour préciser le délai entre la pré-médication et la désensibilisation.			
Famotidine IV : 30 min avant le sac # 1			
Cetirizine PO : 60 min avant le sac # 1			
Dexamethasone IV : 30 min avant le sac # 1			
Diphenhydramine IV : 30 min avant le sac # 3			
AAS PO : 60 min avant le sac # 1			
Montélukast PO : 60 min avant le sac # 1			
Le fichier Excell de désensibilisation a été modifié			
@Thomas Joly-Mischlich			

Historique

#1 - 2025-09-11 14:10 - Emile Bouchard

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Assigné à mis à Thomas Joly-Mischlich
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2025-09-11 19:47 - Thomas Joly-Mischlich

- Statut changé de Accepté à Attente MEP

fait en DEV

#3 - 2025-09-25 17:14 - Thomas Joly-Mischlich

- Statut changé de Attente MEP à Résolu