

Réactiver le vaccin COVID Spikevax (Moderna) svp

2025-10-07 19:38 - Mélanie Lacerte

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Urgent	Echéance:	2025-10-15
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane, SCAS		

Description

Début de la campagne saisonnière vaccination le 15 octobre. SVP réactiver le vaccin Spikevax 0.1mg/ml.
POsologie:

Spikevax

Administrer 0,25 ml du format multidose par voie IM aux enfants âgés de 6 mois à 11 ans, et 0,5 ml du format multidose ou tout le contenu de la seringue unidose aux personnes âgées de 12 ans et plus. Ne pas

SI possible de mettre un pop-up avec ces indications pour cette année :

- Personnes âgées de 65 ans et plus.
- Personnes âgées de 6 mois à 64 ans immunodéprimées ou dialysées, ou vivant avec l’une des conditions chroniques suivantes :
 - Troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques (dont la dysplasie bronchopulmonaire, la fibrose kystique et l’asthme) assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers;
 - États chroniques tels qu’un diabète, des erreurs innées du métabolisme (p. ex. tyrosinémie héréditaire de type I), une obésité importante (à titre indicatif, IMC ≥ 40), des troubles hépatiques (incluant une cirrhose), rénaux ou hématologiques (incluant une asplénie, une anémie ou une hémoglobinopathie), un cancer;
 - Conditions médicales entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires, la trisomie 21);
- Personnes âgées de 18 ans et plus vivant dans une communauté isolée et éloignée.
- Personnes enceintes.

POUR scas:

Spikevax (0,10 mg/ml)			
État	Entreposage	Transport	Temps de décongélation
Fiole multidose non entamée	Entre -50 et -15 °C jusqu'à la date de péremption	Autorisé entre -50 et -15 °C	2 heures pour une fiole multidose entre 2 et 8 °C
	Entre 2 et 8 °C pendant 50 jours.	OU entre 2 et 8 °C : délai maximal 36 heures (cumulatives)	OU 45 minutes pour une fiole multidose à température ambiante
			Ne pas recongeler
Fiole entamée	Entre 2 et 8 °C jusqu'à 24 heures après la 1 ^{re} perforation	Autorisé entre 2 et 8 °C : délai maximal 24 heures (cumulatives)	Ne pas recongeler
Vaccin prélevé en seringue	Entre 2 et 8 °C jusqu'à 24 heures après la 1 ^{re} perforation de la fiole	Autorisé entre 2 et 8 °C : délai maximal 24 heures (cumulatives)	Ne pas recongeler

Historique

#1 - 2025-10-07 20:21 - Myriam Breton

Mis sur ma todo. J'active le 15.

#2 - 2025-10-30 12:27 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à Résolu

C'est fait DEV et PROD

Fichiers

clipboard-202510071535-6hlrx.png	23,7 ko	2025-10-07	Mélanie Lacerte
clipboard-202510071536-a5diy.png	112 ko	2025-10-07	Mélanie Lacerte
clipboard-202510071537-nkvjy.png	97,8 ko	2025-10-07	Mélanie Lacerte